



### **Gabinet chirurgiczny:**

Konsultacja chirurgiczna-porady w zakresie chirurgii ogólnej, w tym kwalifikacje do zabiegów, diagnostyka, chorób chirurgicznych, drobne zabiegi chirurgiczne w miejscowym znieczuleniu.

### **Usuwanie znamion barwnikowych**

Chirurgiczne wycięcie (w całości) jest jedyną zalecaną metodą leczenia znamion. Ponieważ każdy z nas posiada na swej skórze przeciętnie do kilkudziesięciu tego typu zmian- usuwamy jedynie te, które budzą tzw. „niepokój onkologiczny”. Regułą jest w tym przypadku badanie histopatologiczne, czyli mikroskopowe, które wykonuje doświadczony histopatolog.

### **Usuwanie zmian skórnych i tkanki podskórnej**

W miejscowym znieczuleniu usuwamy zmianę, która daje dolegliwości lub jest szpecąca (kaszki, tłuszczaki, blizny skórne i inne), w miarę potrzeby wykonujemy także badanie histopatologiczne. Istnieje możliwość znieczulenia ogólnego z udziałem anestezyjologa.

Operacja przepukliny (pachwinowa, udowa, pępkowa) - wykonujemy plastykę ubytku, który stanowi powód powstania przepukliny, w miarę potrzeby stosujemy wszczep z siatki przepuklinowej.

### **Operacja ginekomastii**

W niektórych sytuacjach u mężczyzn dochodzi do powiększenia gruczołu piersiowego, co bywa przyczyną dolegliwości bólowych czy wstydlwym defektem kosmetycznym. Powiększony gruczoł usuwamy w trybie jednodniowym. Mniejsze zmiany usuwamy w znieczuleniu miejscowym, większe, zwłaszcza obustronne wymagają znieczulenia ogólnego, co wydłuża czas trwania operacji i pobyt po zabiegu.

### **Operacja stulejki**

Problem może wystąpić w każdym wieku-dotyczy chłopców jak i dorosłych mężczyzn, może prowadzić do znacznego utrudnienia, ale niekiedy także zupełnie uniemożliwia odprowadzenie napletka. Sytuacja taka prowadzi do problemów higienicznych w tej okolicy, a te do stanów zapalnych lub znacznie utrudni czy uniemożliwia współżycie.

### **Laserowe usuwanie zmian skórnych**

zmiany na skórze typu brodawki, można usuwać przy pomocy lasera. Zabieg najczęściej nie wymaga to znieczulenia miejscowego ani zakładania szwów. Tym sposobem można usuwać zmiany nie budzące wątpliwości co do rozpoznania, a więc nie wymagające badania mikroskopowego. Wszystkie pozostałe wymagają usunięcia chirurgicznego i przesłania do badania histopatologicznego.

### **Operacja żyłaków odbytu sposobem Barrona**

W przypadku powiększonych, dokuczliwych, często krwawiących guzków krwawniczych, tzw. żyłaków odbytu można wykonać zabieg założenia podwiązki z gumki na żyłak, co powoduje jego samoistne odpadnięcie po pewnym czasie. Zabieg nie wymaga znieczulenia, w trakcie jednego zabiegu można „zagumkować” jeden, maksymalnie dwa guzki, co często wystarcza.

### **Operacja paznokcia wrastającego**

Ta dolegliwa przypadłość dotyczy najczęściej dużego palca u stopy. W znieczuleniu wykonujemy plastyczną naprawę paznokcia, co po wygojeniu daje całkowite wyleczenie-palec i paznokcieć wygląda prawidłowo, dolegliwości ustępują. Zreguły zabieg wykonywany laserowo-bez szwów chirurgicznych.