



Laserowe ablacja żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej

Przy użyciu specjalnego urządzenia laserowego i światłowodu zamyka się niewydolną żyłę, która w ciągu kilku tygodni zmniejsza się i zupełnie znika. Dolegliwości związane z żylakami ustępują niemal natychmiast po zabiegu. Zabieg przede wszystkim przeznaczony jest do usuwania dużych żylaków, które dotąd leczono wyłącznie operacyjnie-zabieg laserowy nie wymaga znieczulenia ogólnego ani dokręgowego, przeprowadza się go w miejscowym znieczuleniu, bez potrzeby pobytu w szpitalu, a jest równie lub nawet bardziej skuteczny niż tradycyjna operacja. Po zabiegu konieczne jest noszenie pończoch pooperacyjnych. Pacjent krótko po zabiegu może wrócić do pracy.

Miniflebektomia

W miejscowym znieczuleniu, z drobnych nacięć skóry (1 mm) specjalnym haczykiem usuwamy szpecące, poszerzone żyłki. Zabieg praktycznie nie pozostawia blizn, często nie wymaga nawet zakładania szwów.

Skleroterapia piankowa

Służy do zamykania niewydolnych szpecących żył na nogach. Wykonujemy ją pod kontrolą USG. Cienką igłą nakłuwamy żyłę, a następnie podajemy spieniony lek, który z czasem powoduje jej zarośnięcie. Metoda jest bezpieczna i skuteczna, zabieg trwa około pół godziny, nie wymaga znieczulenia, całkowity cykl leczenia wymaga od 1 do 7 sesji w odstępach jedno-, dwutygodniowych. Regułą jest noszenie pończoch przeciwżylakowych po zabiegu. Cena zawiera 2 wizyty.

Likwidowanie żylaków obocznic - żylaki siatkowate, teleangiektazje

Laserowe usuwanie „pajęczków naczyniowych”

Przy pomocy naczyniowego lasera diodowego 940 nm zamykamy przezskórnie szpecące naczynka na nogach, twarzy tułowiu. Dla zniesienia uczucia bólu podczas zabiegu stosujemy nadmuchowe znieczulenie zimnym powietrzem, co sprawia że zabieg staje znacznie mniej nieprzyjemny.